

Pleurothallis lepanthoides Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, gracilis, 10—15 cm. alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, tenuibus, glabris; caulibus

gracilibus, erectis vel adscendentibus, unifoliatis, teretibus, vaginis 4—6 arete amplectentibus, ostio ampliato ovato acuminato muriculato-ciliolatis omnino obtectis, 4—7 cm longis, supra basin 1—1,5 mm diametentibus, saepius superpositis; folio erecto vel subrecto, oblongo, obtuso, basi in petiolum perbrevem contracto, 1,5—2,5 cm longo, medio fere usque ad 1 cm lato; inflorescentiis 1—2-nis, erectis, gracillimis, sublaxe 10—20-floris, pedunculo setiformi usque ad 2 cm longo inclusu usque ad 7 cm longis, distichis, sed positione florum verosimiliter secundis; bracteis minutis, ovato-cucullatis, apiculatis, pedicello ovarii 3—4-plo brevioribus; floribus in sectione medioeribus, tenuissimis, glabris, haud inversis; sepalis lanceolatis, longius acuminatis, 3-nerviis, 5,5 mm longis, lateralibus falcato-obliquis; petalis parvulis, oblique obovato-oblongis, obtusissimis, uninervis, 2 mm longis; labello linguiformi, obtuso, in tertia parte basilari leviter rhombo-dilatato, carinis 2 tenuibus parallelis percurso, quam petala paululo longiore; columna gracili, parvula, 1,5 mm longa, juxta stigma margine utrinque semiquadrato-dilatata, clinandrio elato, sub-integro, pede mediocri; ovario graciliter pedicellato, 3,5 mm longo.

Cauca. --- M. Madero.

Offenbar sind die Blüten dieser reizenden, zu den „*Lepanthiformes*“ zu rechnenden Art weißlich oder gelblich.

Die Art steht wohl der unten beschriebenen *P. peniculus* Schltr. am nächsten, hat aber recht verschiedene Blütenteile.