

953. *TRIGONIDIUM Seemannii*, Rchb. fil.; pedunculo prope pedali subflexuoso pluri(7)vaginato, vaginis arctis apicibus in basibus superioribus imbricantibus, sepalo summo a basi ligulato-cuneata dimidio superiori abrupte ovali acuto, sepalis lateralibus cuneato-oblongis acutis, apice reflexis, tepalis ligulatis acutis, basi attenuatis, apice (ex lateribus involutis) cucullato-incrassatis, quam sepala dimidio brevioribus, quintam illorum latitudinis partem æquantibus, labello ligulato trilobato, lobo medio subcordato acutiusculo, per totam paginam callosulo, lateribus suis posticis incisuras loborum laterali-um tegente, lobis lateralibus retusissimis incisuris illis minutis efformatis, nervis labelli mediis longitudinaliter carinulato-incrassatis, gynostemio postice apice acuto, anthera . . .—Sepalo supremo, petalis ac labello recedit ab affinibus *T. obtuso*, Lindl., ac *T. Egertoniano*, Bat. Hujus tamen descriptio valde manca. Speciem insignem indefesso cl. Seemann dicavi. Rara videtur, cum inter copiam Orchidearum centro-americanarum, quam teneo, haud amplius occurrat. Panama, 539.