

Pogonia nitida Schltr. n. sp.

Terrestris, erecta, parvula, nitida, c. 10 cm alta; radice carnosa, villosula; caule herbaceo, erecto, dimidio inferiore vaginis paucis arcte amplectentibus obsesso, medio unifoliato, supra bracteis foliaceis donato, tereti, glabro; folio sessili basi amplectente, ovali, subacuto, marginibus leviter undulato, c. 1,3 cm longo, medio fere 1—1,2 cm lato, herbaceo; racemo laxe 4—5-floro; bracteis folio valde similibus et vix minoribus, apicem versus sensim paulo decrescentibus, ovario pedicellato fere aequilongis; floribus erectis, parvulis in genere, glabris, tenuibus, ut videtur pallide roseis; sepalo intermedio erecto, anguste lanceolato-ligulato, acuto, 1,2 cm longo, lateralibus erectis anguste lanceolato-ligulatis, acutis, falcatis, c. 9 mm longis, supra medium paululo dilatatis; petalis falcato-linearibus subacutis, medio fere paululo dilatatis, sepalis lateralibus fere aequilongis; labello e basi linear-unguiculata sensim dilatato, lamina ovato-elliptica, acuminata, supra medium trilobata, medio fere lamellis 3 brevibus parallelis ornato, lobis lateralibus parvulis rotundatis, intermedio ovato, acuminato, margine undulatocrenulato, nervis 3 medianis carunculato-fimbriatis, lateralibus multo majore, labello toto c. 1 cm longo, medio fere 4 mm lato; columna gracili, glabra, 8 mm longa; ovario cum pedicello gracili glabro, pedicello inclusu c. 1,5 cm longo.

Costa Rica: Hiquito am Jurubres, 300 m, im humosen Wiesengrund unter lichtem Bananen-Halbschatten. — C. Bradé 1909.

Eine nahe Verwandte der *P. mexicana* Wats., gut unterschieden durch die kürzeren am Rande leicht gewellten Blätter, kleineren Blüten und die Form des Labellums.