

WARSCIEWICZELLA TIMBIENSIS P. Ortiz, sp. nov.

Similis speciei dictae *Cochleanthes* (*Warscewiczella*) *guianensis* Laf., Gerl. & Sengh. sed differt lobis lateralibus clare evolutis, venis percurrentibus laminam labellarem multo numerosioribus et solidis, et callo basali non semicirculari sed quadrato.

Tipo: COLOMBIA: Cauca, Timbío, 1700 m. Col. Edwin Astaiza Tálaga, 22 abril. 2002, cultivada en Timbío, flor febrero. 2005. *P. Ortiz* 1229 (Herbario de la Universidad Javeriana, Bogotá [HPUJ]). Holótipo.

Descripción: **Plantas** epífitas, acaules, con raíces gruesas, hojas en abanico. Vainas foliares en la base, una a cada lado, hojas oblongo-obovadas, de hasta 24 cm de largo por 4,5 cm de ancho. **Inflorescencia** de la axila de una vaina foliar, de 15 cm de largo, con 5 brácteas infundibuliformes, agudas, de 1 cm de largo, uniflora. **Flor** vistosa, sépalos y pétalos de color amarillo verdoso, labelo con fondo blanco recorrido radialmente por numerosas venas ramificadas, resaltadas, de color morado-azuloso oscuro, más densas hacia el borde apical; **sépalo** dorsal erecto, oblongo-elíptico, agudo, de 3 por 1 cm; **sépalos** laterales retrorsos, oblongos, ligeramente falcados, de 3 por 0,7 cm; pétalos extendidos hacia los lados, oblongo-obovados, obtusos, ensanchados apicalmente, de 3 por 1,4 cm. **Labelo** trilobulado, basalmente cóncavo, luego más o menos aplanado, con lóbulos basales definidos, falcados, mucho más cortos que el central, los cuales envuelven la columna, lóbulo central ancho y extendido, suborbicular, con los bordes ondulados. Densamente recorrido radialmente por venas ramificadas, resaltadas, de color morado-azuloso oscuro, más densas hacia los bordes,

callo más o menos cuadrado en la base, con una leve quilla central bifurcada en el medio, ápice leve y obtusamente triapiculado, de 4 cm de ancho por 4,5 cm de largo, más alto en la base. **Columna** lateralmente ensanchada en el ápice, de 1 cm de largo, de color blanco. Polinios 4
Ver foto caratula e ilustración 5


Etimología: De Timbío (Cauca), la población donde fue encontrada la especie.

Distribución: La especie ha sido encontrada en una sola localidad de este municipio.

Este es uno de los hallazgos más interesantes de los últimos tiempos hechos en Colombia en materia de especies ornamentales. El tamaño y el colorido de las flores hacen de esta una especie de gran valor ornamental. El color y el tamaño del labelo recuerdan los de *Warscewiczella picta* o de *Cochleanthes flabelliformis*, pero las diferencias son notorias: el callo es completamente distinto y los lóbulos laterales que envuelven la columna hacen que la debamos asignar al género *Warscewiczella*. Quizás la especie que más parecido presenta con este nuevo taxon es la que fue publicada como *Cochleanthes guianensis* Laf., Gerl. & Sengh., que sin embargo tiene un labelo no trilobulado, presenta un colorido mucho más pálido, con menos venas, y un callo diferente (véase *Die Orchidee* 42 (6): 280-287. 1991).

Sobre el reconocimiento del género *Warscewiczella* frente a *Cochleanthes* remitimos al artículo de ROBERT L. DRESSLER, Precursor a una revisión del complejo *Chondrorhyncha*, en *Orquideología* 21 (3) 248-255. 2000.

Nota: El genero fue publicado inicialmente por Reichenbach f. como *Warczewiczella* (Bonpl.), aunque hubiera sido mas correcto escribir *Warscewiczella* y el mismo autor posteriormente lo escribió de esta otra manera. Ateniéndonos al principio de prioridad usamos la grafia adoptada en el *Index Nominum Genericorum*.



WARSCIEWICZELLA TIMBIENSIS P. ORTIZ, SP. NOV.

Ilustrador: PEDRO ORTIZ V.

Ilustración 5