



CHONDRORHYNCHA ANDRAEAE Ortiz

Cultivo: Orquídeas del Valle.

Fotografía: Andrea Niessen.



CHONDRORHYNCHA ANTONII Ortiz

Cultivo: Orquídeas del Valle.

Fotografía: Rodrigo Escobar R.



CHONDRORHYNCHA CARINATA Ortiz


Cultivo: Colomborquídeas.

Fotografía: Rodrigo Escobar R.




WARREOPSIS PURPUREA Ortiz


Fotografiada in situ por Pedro Ortiz V.




CHONDRORHYNCHA ANDRAEAE
Ortiz



CHONDRORHYNCHA ANTONII
Ortiz



CHONDRORHYNCHA CARINATA
Ortiz



WARREOPSIS PURPUREA
Ortiz

WARREOPSIS PURPUREA Ortiz, sp. nov.

TIPO: Putumayo: Sibundoy, 2300 m, abril 1977, *P. Ortiz 927* (Holotipo. Herbario de la Universidad Javeriana, Bogotá [= UJCOL]).

Species haec dignoscitur colore caeruleo-purpureo florum, labello late obovato apice acuto, columna praedita iuxta basim crista protrudente.

Plantas terrestres, medianas, con tallos abreviados, cubiertos de vainas foliares imbricadas, sin pseudobulbos aparentes, con hojas oblongo-elípticas, estrechas en la base, agudas en el ápice, plicadas, con venas prominentes por el envés, de hasta 60 cm de longitud y 6 cm de anchura máxima. **Inflorescencia** lateral, producida de la axila de una de las vainas foliares, de unos 75 cm de longitud, con brácteas agudas a lo largo del escapo y debajo de las flores, en racimo multifloro. **Flores** medianas, de color morado azulado, labelo más oscuro hacia el centro y más pálido en los bordes, callo y columna blancos. Sépalo dorsal oblongo con ápice agudo, bastante cóncavo, de 12 x 4.6 mm; sépalos laterales oblongos con apice agudo, un poco falcados, con los bordes inferiores involutos, de 14 x 5.6 mm; pétalos oblongos con ápice agudo, de 10 x 4.3 mm; labelo anchamente obovado con ápice agudo, con un callo semicircular compuesto de seis carnosidades irregulares, las centrales más grandes. **Columna** casi cilíndrica, con una cresta prominente en la base por la parte ventral; rostelo formado por dos dientes curvos, polinios cuatro, en dos pares desiguales, con estípite oblongo agudo.

ETIMOLOGÍA: Por el color morado de las flores.

Esta especie es semejante a *Warreopsis colorata* (Linden & Rchb. f.) Garay, pero se distingue de ella ante todo por el color azul-morado profundo de las flores y además por la forma del labelo y de la columna. Una buena ilustración de esa otra especie puede verse en Dunsterville & Garay, *Orchids of Venezuela*. An Illustrated Field Guide, p. 1039. Las otras dos especies de *Warreopsis* (*W. pardina* [Rchb. f.] Garay y *W. parviflora* [L. O. Wms.] Garay) son más claramente diferentes por la forma del labelo. La nueva especie aquí descrita no parece ser común. No conozco más localidades que la indicada para el tipo (Sibundoy, Putumayo).

WARREOPSIS PURPUREA Ortiz

TYPE: Putumayo: Sibundoy, 2300 m, April 1977, *P. Ortiz* 927 (Holotype. Herbarium of the Universidad Javeriana, Bogotá [UJCOL]).

Plants terrestrial, medium-sized, with short stems, covered with imbricating leaf-sheaths, without apparent pseudobulbs, the leaves oblong-elliptic, narrow at the base, acute at the apex, plicate, with prominent veins on the underside, up to 60 cm long and 6 cm broad. **Inflorescence** lateral, from the axil of one of the leaf-sheaths, about 75 cm long, with acute bracts along the scape and under the flowers, a many-flowered raceme. **Flowers** medium-sized, bluish-purple in color, the label darker towards the center and paler on the margins, the callus and the column white. Dorsal sepal oblong with acute apex, rather concave, 12 x 4.6 mm; lateral sepals oblong with acute apex, somewhat falcate, with the inferior margins involute, 14 x 5.6 mm; petals oblong with acute apex, 10 x 4.3 mm; lip broadly obovate with acute apex, with a semicircular callus, composed of six fleshy, irregular, protuberances, the central ones larger. **Column** almost cylindrical, with a prominent ridge along the ventral part of the base; rostellum formed by two curved teeth, pollinia four, in two unequal pairs, with oblong acute stipe.

ETYMOLOGY: in allusion to the purple color of the flowers.

This species is similar to *Warreopsis colorata* (Linden & Rchb. f.) Garay, but differs from it above all in the deep bluish-purple color of the flowers and as well as in the shape of the lip and the column. A good illustration of that species can be seen in Dunsterville & Garay, *An Illustrated Field Guide*, p. 1039. The other two species of *Warreopsis* (*W. pardina* [Rchb. f.] Garay and *W. parviflora* [L. O. Wms.] Garay) are more clearly different in the shape of the lip. The newly described species does not seem to be widespread. I do not know of any other locality apart from the one given for the type (Sibundoy, Putumayo).