

347. *Xerorchis amazonica* Schltr., nov. spec.

Terrestris, erecta, gracillima, 40 - 45 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, longius pilosis, subvillosis; caulibus simplicibus, gracillimis, basi vaginulis dissitis obsessa excepta laxe foliatis, subflexuosis, rigidulis praesertim apicem versus nervis prominulis angulatis; foliis erecto-patentibus, lanceolato-linearibus, acutis vel apiculatis, glabris, textura subcoriaceis, nervosis, 1,8—2,5 cm longis, infra medium 1,75—2,25 mm latis; racemo fractiflexo, laxe 8—15-floro, usque ad 8 cm longo; bracteis foliis omnino conformibus, flores plus minusve excedentibus, apicem versus decrescentibus; floribus parvulis, erecto-patentibus; sepalis anguste ligulatis, obtusiusculis vel subacutis, glabris, c. 0,7 cm longis, lateralibus obliquis; petalis sepalis similibus et fere aequilongis, glabris, obliquis; labello e basi subunguiculato-cuneata pandurato-trilobato, glabro, nudo, 0,6 cm longo, lobis lateralibus parvulis, abbreviatis, intermedio multo majore e basi angustiore suborbiculari, margine subcrenato-undulato, 3,2 cm longo; columna gracili, semitereti, glabra, 3,75 mm longa, apicem versus paululo dilatata, juxta stigma utrinque in brachium uncinato-falcatum, decurvulum producta; anthera et polliniis generis; ovario cum pedicello gracili glabro, c. 5 mm longo.

Brasilien: Auf Sandboden bei Manaos. — E. Ule (Amazonas Expedition) no. 5425, blühend im Februar 1901.

Meinen obigen Ausführungen habe ich nichts mehr über die Pflanze zuzusetzen, ich möchte hier nur noch erwähnen, dass ein Teil der Blüten an dem mir gütigst vom Sammler überlassenen Exemplar stark verbildet war.